

ATENDIMENTO AO ESTOMIZADO COM PENFIGOIDE BOLHOSO – ESTUDO DE CASO

Rosaura Soares Paczek, Thiago Kroth de Oliveira
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: O pefigoide bolhoso (PB) é uma dermatose autoimune, afetando idosos com predominância no sexo masculino, sendo rara em crianças e adultos jovens, é uma doença crônica com exacerbações espontâneas e remissões 1,2. Ocorrem lesões bolhosas grandes e tensas, com predileção por áreas flexurais, iniciando com lesão pruriginosa, seguida de erupção generalizada e formação de bolhas. A ocorrência concomitante de PB e doenças neoplásicas malignas é frequente, todavia ainda não foi possível estabelecer a relação de causa e consequencia ³. **Objetivo:** Descrever a experiência no atendimento a paciente estomizado com penfigoide bolhoso no que se refere a dificuldade de fixação de equipamento coletor. **Método:** Estudo descritivo do tipo estudo de caso sobre o atendimento a um paciente com penfigoide bolhoso e com colostomia que apresentava dificuldade na fixação do equipamento coletor devido as lesões. Paciente do sexo masculino, com 67 anos, diagnosticado com penfigoide bolhoso através de biópsia, em novembro de 2017, fez investigação clínica e foi diagnosticado neoplasia de retossigmóide. Em maio de 2018 realizou retossigmoidectomia com colostomia a esquerda. Para realização da cirurgia necessitou interromper tratamento do PB e lesões exacerbaram, apresentando infecção secundária em algumas lesões. Chegou para atendimento em julho de 2018 com lesões extensas por todo o corpo, o que acarretava dificuldade para manter o equipamento coletor aderido a pele. **Resultados:** Após a cirurgia reiniciou o tratamento para o PB. Foi realizado hidratação da pele e escolha de um equipamento que pudesse se manter aderido por mais dias, testamos 3 tipos de bolsas até obter uma que ficasse por mais tempo aderida, Paciente foi acompanhado durante 5 meses, com melhora da fixação do equipamento coletor e completa recuperação da pele. **Conclusão:** Cabe ao enfermeiro estomaterapeuta ou enfermeiro capacitado o atendimento a pacientes estomizados que apresentam lesões de pele, buscando o equipamento adequado à necessidade de cada indivíduo.

Implementando ações que busquem a prevenção de maiores danos, recuperação da saúde, e conseqüentemente melhor qualidade de vida.

Descritores: Penfigoide; Cuidados de Enfermagem; Estomia.

Referências

Zanella RR, Xavier TA, Tebcherani AJ, Aoki V, Sanchez APG . Penfigoide bolhoso no adulto mais jovem: relato de três casos An Bras Dermatol. 2011;86(2):355-8.

Simões IMG, Ferreira O. Rev Port Med Geral Fam [Internet]. 2018 Abr [citado 2019 Jan 31] ; 34(2): 96-100. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-51732018000200006&lng=pt

Borelli NS et all. Michalany§ Med Cutan Iber Lat Am 2016; 44 (3): 225-228 Penfigoide bolhoso: chamando a atenção para concomitância com neoplasias malignas <http://www.medigraphic.com/pdfs/cutanea/mc-2016/mc163m.pdf>.