

# 30



## Semana de **Enfermagem**

Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Escola de Enfermagem da UFRGS

**Data:** 15 a 17  
maio  
2019

# Anais

Promoção



## **HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**

### **Diretora-Presidente**

Professora Nadine Oliveira Clausell

### **Diretor Médico**

Professor Milton Berger

### **Diretor Administrativo**

Jorge Bajerski

### **Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação**

Professora Patrícia Ashton Prolla

### **Coordenadora do Grupo de Enfermagem**

Professora Ninon Girardon da Rosa

### **Coordenador do Grupo de Ensino**

Professor José Geraldo Lopes Ramos

## **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Reitor**

Professor Rui Vicente Oppermann

## **ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRGS**

### **Diretora**

Gisela Maria Schebella Souto de Moura

### **Projeto gráfico, ilustração e diagramação**

Gleci Beatriz Luz Toledo

### **DADOS INTERNACIONAIS PARA CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)**

S471a Semana de Enfermagem (30. : 2019 : Porto Alegre, RS)

Anais [recurso eletrônico] / 30. Semana de Enfermagem; promoção e realização Grupo de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; coordenação geral: Maria Luzia Chollopetz da Cunha. – Porto Alegre: HCPA, UFRGS, Escola de Enfermagem, 2019.  
E-book

Evento realizado de 15 a 17 de maio de 2019.

ISBN

1.Enfermagem - Eventos. I. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Grupo de Enfermagem. II. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. III. Cunha, Maria Luzia Chollopetz. IV Título.

NLM WY3

CATALOGAÇÃO NA FONTE: Rubens da Costa Silva Filho CRB10/1761

cuidado, idade do idoso, se o cuidador possuía auxílio de outra pessoa para o cuidado, se o idoso possuía renda e se o cuidador tinha despesas retirada de sua renda para cobrir gastos com o idoso. Na análise bivariada utilizaram-se coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman e teste t-student ou Análise de Variância (ANOVA) complementada por Tukey. Para a análise multivariada utilizou-se a Regressão Linear. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI/FW sob parecer nº 1457.332. **Resultados:** Houve predomínio do sexo feminino 92(73,6%) com média de idade 50,5 ± 15,2, 69 anos. Entre os cuidadores a mediana dos anos de estudo foi 10,5 (5-15), sendo que 69(55,2%) eram casados ou residiam com companheiro. Em relação ao grau de parentesco 85(68,0%) eram filhos que cuidavam de seus pais idosos e 78 (62,4%) residiam com o idoso. A mediana do tempo de cuidado ao idoso(h/semana) foi de 7 (4,8–15). Verificou-se maior impacto na sobrecarga no domínio tempo dependente (11,6 ± 5,12). Após ajuste pelo modelo multivariado, as variáveis que permaneceram associadas com a sobrecarga foram: sexo do cuidador (p=0,017) anos de estudo (p=0,023), tempo de cuidado (p=0,045) e residir com o idoso (p=0,013). **Conclusão:** Cuidadores do sexo feminino que dispensaram maior tempo de cuidado semanal e residiam com o idoso apresentaram maior sobrecarga ao passo que os cuidadores com maior escolaridade, apresentaram menor sobrecarga.

**Descritores:** Cuidador; Idoso; Apoio Social.

#### **Referências**

VALER, D. B.; AIRES, M.; FENGLER, F. L.; PASKULIN, L. M.G. Adaptação e Validação do Inventário de Sobrecarga do Cuidador para uso em Cuidadores de idosos. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 23, n. 1, p. 130-8, 2015. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/115349/000963475.pdf?sequence=1> Acessado em: 26 fev.2019.

JESUS, Isabela Thaís Machado de; ORLANDI, Ariene Angelini dos Santos; ZAZZETTA, Marisa Silvana. Burden, profile and care: caregivers of socially vulnerable elderly persons. *Rev. bras. geriatr. gerontol.*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 194-204, Apr. 2018. Available from <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1809-98232018000200194&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232018000200194&lng=en&nrm=iso)>. access on 27 Feb. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562018021.170155>.

DUARTE, António; JOAQUIM, Natércia; LAPA, Fátima; NUNES, Cristina. Qualidade De Vida E Sobrecarga Dos Cuidadores Informais Dos Pacientes Idosos Das Unidades De Cuidados De Assistência Domiciliar Do Algarve (Pt). *SaBios: Rev. Saúde e Biol.*, v.11, n.3, p.12-26, jan./abr., 2017. Acessado em: 27 de fevereiro de 2019. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/317368268\\_Qualidade\\_de\\_vida\\_e\\_sobrecarga\\_dos\\_cuidadores\\_informais\\_dos\\_pacientes\\_idosos\\_das\\_unidades\\_de\\_cuidados\\_de\\_assistencia\\_domiciliar\\_do\\_Algarve\\_Quality\\_of\\_life\\_and\\_burden\\_of\\_informal\\_caregivers\\_of\\_elderly\\_](https://www.researchgate.net/publication/317368268_Qualidade_de_vida_e_sobrecarga_dos_cuidadores_informais_dos_pacientes_idosos_das_unidades_de_cuidados_de_assistencia_domiciliar_do_Algarve_Quality_of_life_and_burden_of_informal_caregivers_of_elderly_).

## **TEMPO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM PACIENTES NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA**

Lisley Thiele Nunes Neves, Priscilla Ferreira Saldanha, Karina Oliveira Azzolin  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**Introdução:** Doenças cardiovasculares, ocupam o primeiro lugar entre as doenças mais prevalentes mundialmente e intervenções cirúrgicas são necessárias para cessar uma situação de morte ou debilitação eminente. A ventilação mecânica é um recurso utilizado no perioperatório de grandes cirurgias, como a cirurgia cardíaca, quando o paciente necessita de auxílio total para manter sua ventilação, oxigenação e equilíbrio ácido-básico, principalmente no pós-operatório. O desmame ventilatório preconizado para estes pacientes seria em até 6 horas após o procedimento, porém, no Brasil, o tempo médio pode variar até 12 horas, o que aumentaria relativamente a incidência de complicações, do

tempo das internações hospitalares e óbitos. **Objetivos:** Mensurar o tempo de ventilação mecânica invasiva (VMI) nos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Método:** Trata-se de um estudo transversal retrospectivo. A amostra é composta por pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, durante o ano de 2016, 39 pacientes de 2017 e 09 de 2018. Critérios de inclusão: pacientes que realizaram cirurgia cardíaca de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com uso de circulação extracorpórea, com abordagem esternal e que foram entubados. Os critérios de exclusão são pacientes traqueostomizados, óbitos transoperatórios e pacientes com reintervenções. Os dados foram coletados do prontuário do paciente e digitados em um banco de dados Microsoft Excel e analisados no pacote Statistical Package for Social Science (SPSS v.21). Este estudo foi aprovado pelo CEP institucional, n:19639413530025327. **Resultados preliminares:** Foram analisados 188 prontuários, as cirurgias mais realizadas foram cirurgia de revascularização de miocárdio e cirurgia de revascularização de miocárdio com troca de valva aórtica, 57,9% eram do sexo feminino, 93% dos pacientes eram brancos, com média de idade de 62,2 anos, as comorbidades mais prevalentes foram diabetes mellitus, hipertensão arterial e ex tabagismo. O tempo médio de extubação foi de 7,02 horas, as complicações no pós-operatório mais incidentes foram arritmias, acidose metabólica e sangramento. **Conclusão:** A partir desta análise parcial pode-se concluir que o protocolo de desmame adotado nesta instituição está coincidindo com os parâmetros nacionais, apesar de ainda estar acima do preconizado.

**Descritores:** Cirurgia Torácica; Respiração Artificial; Saúde do Adulto.

#### **Referências**

Borgonovo dos Santos, Marcelo. Comparação dos resultados Iniciais entre cirurgias de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. Arquivos Catarinenses de Medicina, [S.L.], V. 47, N. 2, p. 170-181, jun. 2018.

Sengupta, Saikat; Chakravarty, Chandrashish; Rudra, A. Desmame de ventilação mecânica baseado em evidências:: Uma revisão. 2018. Intensive Care Tutorial 372.

Santos, Miquéias Bogado Kasctin dos et al. Desfechos clínicos de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital do noroeste do Rio Grande do Sul. Revista de Enfermagem da Ufsm, [s.l.], v. 6, n. 1, p.102-111, 25 abr. 2016. Universidad Federal de Santa Maria.

### **TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS COMO INDICADOR DE QUALIDADE ASSISTENCIAL EM PESQUISA CLÍNICA**

Adriana Serdotte Freitas Cardoso, Suzana Muller, Juliana Borges, Caína Zanini de Carvalho, Eneida Rejane Rabelo-Silva, Isabel Cristina Echer  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**Introdução:** A complexidade do cenário contemporâneo dos serviços de saúde demanda conhecimentos gerenciais voltados para a obtenção dos melhores resultados a partir de processos seguros de cuidado. Nesse contexto, a enfermagem destaca-se como uma profissão que trabalha na avaliação constante do cuidado para alinhar as melhores práticas. Assim, a enfermagem do Centro de Pesquisa Clínica (CPC) atua no gerenciamento de ações relacionadas à pesquisa e no cuidado direto aos participantes para a administração de medicamentos em teste, o que demanda boas práticas clínicas, treinamentos específicos referentes aos protocolos de pesquisa e ética em pesquisa. A avaliação da qualidade do cuidado prestado faz-se necessária para que o planejamento e as ações a serem desenvolvidas estejam alicerçados em informações concretas capazes de demonstrar a realidade da assistência e sua organização, propiciando comparações e reflexões em diferentes contextos de prática profissional<sup>1</sup>. É nesse panorama dinâmico que desponta a necessidade do desenvolvimento e análise de indicadores que reflitam os processos de trabalho que impactam no cuidado direto, assim como no seu gerenciamento<sup>2</sup>. A mensuração e análise de indicadores gerenciais e assistenciais geram