



Universidade: presente!



XXXI SIC

21. 25. OUTUBRO • CAMPUS DO VALE

Câncer e lesão intraepitelial de alto grau do colo do útero em mulheres com idade inferior ou igual a 30 anos

Cristiano Degasperi, Valentino Antonio Magno

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil

INTRODUÇÃO

No Brasil, o câncer cervical representa o 3º câncer mais frequente em mulheres. As diretrizes nacionais sugerem que o rastreamento do câncer tenha início apenas aos 25 anos.

OBJETIVO

Avaliar a prevalência de pacientes com idade inferior ou igual a 30 anos entre as pacientes com diagnóstico histológico comprovado de câncer do colo do útero ou lesão intraepitelial de alto grau provenientes do ambulatório de ginecologia e obstetrícia do HCPA.

MÉTODOS

Um estudo transversal retrospectivo foi conduzido no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA. Foram arroladas todas as pacientes com diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau (LIEAG) ou câncer de colo do útero em citopatológicos, biópsias e conizações no período de abril de 2006 a novembro de 2017. Os dados foram coletados do prontuário eletrônico da instituição.

RESULTADOS

Um total de 119 mulheres com até 30 anos foram diagnosticadas com LIEAG e câncer de colo de útero. A mediana de idade foi 27,00 anos [25,61–26,74] e a mediana da idade de iniciação sexual foi 15,00 [14,94–15,58]. Nossa amostra demonstrou que 74% das mulheres apresentaram gestação anterior ao diagnóstico, sendo que 35,3% possuíam mais de 3 gestações. Em nosso estudo, foi detectado que 32,8% eram tabagistas ativas.

