



# VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



*"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"*



# Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014  
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

# **VII Simposio do Processo de Enfermagem**

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

*"Revelando novas fronteiras e tecnologias"*

**25 e 26 de agosto de 2014**

**Local**

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Porto Alegre – RS

## PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES EM DIÁLISE PERTITONEAL

Adriana Tessari, Cíntia Caetano Fuji, **Karen Patricia Fengler**, Maria Conceição da  
Costa Proença, Silvana Silva dos Santos

Unidade de Hemodiálise – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**Introdução:** A diálise peritoneal é um dos métodos de terapia renal substitutiva (TRS). Neste tipo de terapia o paciente realiza o tratamento a domicílio, após capacitação do mesmo ou de um cuidador. Nesta modalidade, é fundamental a adesão e o comprometimento do paciente/cuidador para o sucesso da TRS. O enfermeiro deve identificar e monitorar as possíveis complicações da diálise peritoneal, como peritonites, hipertensão/hipotensão, edemas, disfunção do cateter peritoneal e alterações do ósteo. Para isso, a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) se faz necessária, sendo o diagnóstico de enfermagem (DE) uma das etapas da SAE. O levantamento dos DE colabora para a otimização da assistência. **Objetivo:** Identificar os principais diagnósticos de enfermagem (DE) relacionados a pacientes submetidos à diálise peritoneal. **Métodos:** Os DE foram elencados através da realização de grupos focados, com participação de enfermeiros que realizam assistência a pacientes em diálise peritoneal, com base na taxonomia da NANDA-*International* 2012-2014. **Resultados:** Foram eleitos como principais DE: risco de volume de líquido excessivo, risco de infecção, risco de glicemia instável, dor aguda, falta de adesão, tensão do papel de cuidador. **Conclusões:** Compete ao enfermeiro buscar habilidades e conhecimento a fim de prestar uma assistência coerente às necessidades do usuário. Os DE empregados na diálise peritoneal são de suma importância na prática clínica, otimizando a assistência de enfermagem prestada ao paciente e as orientações para familiares com relação a doença e ao tratamento. **Descritores:** Insuficiência Renal Crônica, Diálise peritoneal, Diagnóstico de Enfermagem.