



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PREVALENTES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM CIRÚRGICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Luciana Nabinger Menna Barreto, Bruna Paulsen Panato, Mariana Palma da Silva,
Bruna Engelman, Marcos Barragan da Silva, Isis Marques Severo, Luciana Ramos
Corrêa Pinto, Amália de Fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: O modelo informatizado do processo de enfermagem no Hospital de clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi introduzido no ano de 2000 e contemplou os diagnósticos de enfermagem (DE) segundo a Taxonomia I da NANDA, em conjugação à Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta. Desde então, trabalha-se com os DE de forma sistematizada. **Objetivo:** Identificar os DE mais frequentes nas hospitalizações de pacientes no HCPA no Serviço de Enfermagem Cirúrgica (SEC). **Método:** Estudo retrospectivo, realizado no HCPA. A população contou dos prontuários dos pacientes do SEC hospitalizados em 2012. A coleta dos dados foi realizada por meio de uma query solicitada ao SAMIS, dos meses intercalados de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro de 2012. Os dados foram analisados estatisticamente. **Resultados:** Os 10 DE prevalentes no SEC foram: Dor aguda (18,35%), Integridade tissular prejudicada (17,83%), Risco de infecção (16,80%), Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório (11,76%), Mobilidade física prejudicada (3,22%), Déficit no autocuidado: banho e ou higiene (2,62%), Eliminação urinária prejudicada (2,60%), Ansiedade (2,21%), Conforto prejudicado (1,69%) e Padrão respiratório ineficaz (1,69%). Outros DE contabilizaram um total de 21,23%. **Conclusões:** Os DE identificados como prevalentes no SEC do HCPA caracterizam pacientes cirúrgicos. **Descritores:** Processos de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. Classificação.