



# VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



*"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"*



*Nossa missão é cuidar de você*



# Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014  
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

# **VII Simposio do Processo de Enfermagem**

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

*"Revelando novas fronteiras e tecnologias"*

**25 e 26 de agosto de 2014**

**Local**

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Porto Alegre – RS

## PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM IDENTIFICADOS EM PACIENTES DA UNIDADE DE HEMODIÁLISE

Adriana Tessari, Alessandra Rosa Vicari, KarenPatriciaFengler, Maria Conceição da  
Costa Proença, Guilherme Breitsamater, **Silvana Silva dos Santos**  
Unidade de Hemodiálise – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

**Introdução:** O objetivo da assistência de enfermagem é identificar e monitorar os efeitos adversos da Terapia Renal Substitutiva (TRS) ou complicações decorrentes da própria insuficiência renal, como: hipotensão e hipertensão arterial, câibras, náuseas, vômitos, prurido, cefaléia, dores lombar e torácica, reações de hipersensibilidade, hemorragia, convulsões, reações pirogênicas, hemólise e embolia gasosa. Tais complicações podem ser de fácil manejo ou até mesmo fatais, o que evidencia necessidade de uma assistência de enfermagem atenta, precisa e continuada.

**Objetivo:** Identificar os principais diagnósticos de enfermagem (DE) relacionados a pacientes submetidos à TRS. **Métodos:** Os DE foram elencados através da realização de grupos focados, com participação de enfermeiros que realizam assistência a pacientes em hemodiálise, diálise peritoneal ou em pré ou pós-transplante renal, com base na taxonomia da *NANDA-International* 2012-2014. **Resultados:** Foram eleitos como principais DE: risco de desequilíbrio no volume de líquidos, risco de desequilíbrio eletrolítico, risco de infecção, risco de glicemia instável, risco de perfusão renal ineficaz, risco de sangramento, proteção ineficaz, dor aguda, volume de líquidos excessivo, náuseas, integridade da pele prejudicada, conhecimento deficiente, falta de adesão, desesperança, tensão do papel de cuidador. **Conclusões:** Compete ao enfermeiro buscar habilidades e conhecimento a fim de prestar uma assistência coerente as necessidades do usuário, assim, os DE empregados nas diferentes TRS são de suma importância na prática clínica, otimizando a assistência de enfermagem prestada ao paciente e orientações para familiares com relação a doença e aos tratamentos. **Descritores:** Unidades Hospitalares de Hemodiálise, Insuficiência Renal, Diagnóstico de Enfermagem.