

ANAIS - XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia

65-SESSÃO DE POSTER ELETRÔNICO

28/11/2012 08:00-18:00

ÁREA DE POSTER ELETRÔNICO

[Trabalho 3044]

TUBERCULOSE

ATRASO NO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS.

IGOR GORSKI BENEDETTO; FLAVIA GABE BELTRAMI; TIAGO SPIAZZI BOTTEGA; GREICE HELEN CAPELLI; JORGE MARCELO DORNELLES DIEHL; GUILHERME SEARA MULLER; DENISE ROSSATO SILVA; PAULO DE TARSO ROTH DALCIN;

HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL;

igor_benedetto@yahoo.com.br

Resumo:

Introdução: Os componentes essenciais do controle da tuberculose (TB) são o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. O atraso no diagnóstico e tratamento da TB pode resultar em doença mais extensa, mais complicações, aumento da gravidade da doença e está associado com aumento do risco de mortalidade. **Objetivos:** Identificar fatores relacionados com o atraso no diagnóstico da TB em pacientes hospitalizados. **Métodos:** Foi realizado um estudo transversal em hospital universitário terciário. Pacientes adultos com TB que foram hospitalizados foram identificados retrospectivamente. Fatores de risco para o atraso no diagnóstico (início do tratamento \geq 24 horas após admissão) foram coletados. **Resultados:** Foram incluídos 305 pacientes no estudo. Em 67 (21,9%) pacientes o diagnóstico foi realizado em $<$ 24h e em 238 (78,0%) pacientes, em \geq 24h. Os fatores associados com atraso no diagnóstico na análise multivariada foram: sexo feminino [OR=2,69 (IC95%: 1,26-5,71); p=0,010] e baciloscopia de escarro negativa [OR=5,38 (IC95%: 2,54-11,39); p<0,0001]. **Conclusões:** Embora a hospitalização permita um rápido manejo do paciente e favoreça um diagnóstico rápido, este estudo demonstrou um atraso significativo até o diagnóstico da TB. Estudos futuros devem focar na tentativa de explicar as razões para esse retardo no diagnóstico de pacientes hospitalizados com TB.