

Conclusão: Apesar do risco de viés considerável nos estudos, é possível afirmar que não há interferência da dieta no resultado final do clareamento dentário.

Descritores: Clareamento dental. Clareamento. Dieta.

REABILITAÇÃO COM OVERDENTURE SOBRE QUATRO IMPLANTES UTILIZANDO RETENÇÃO BARRA CLIPE.

Fernando Manoel Pereira Jimenez*, Vivian Chiada Maineri Hekin, Ana Beatriz Pereira de Carvalho, Oswaldo Baptista de Souza Júnior

Este trabalho teve como objetivo demonstrar a importância clínica da realização de uma overdenture mandibular implanto-retida por barra clipe, em um paciente do gênero masculino de 57 anos, com a mandíbula totalmente desdentada e com grande reabsorção do rebordo residual, foram inseridos quatro implantes do Sistema Conexão Master Grip 3,75 x 11,5, com hexágono externo. Após período de três meses, foi realizada uma seqüência de procedimentos clínicos, os quais envolveram moldagem de transferência, obtenção de modelos e todos os procedimentos para realizar uma prótese total superior e overdenture inferior. Uma infra-estrutura com retentores para barra clipe foi encerada e fundida. A prótese foi processada e realizou-se a captura durante a prensagem e polimerização da resina. Uma vez instalada, pode-se concluir que a prótese total mandibular implanto-retida proporcionou maior retenção e estabilidade, devolvendo a função mastigatória e restabelecendo a auto-estima do paciente.

Descritores: Implante Dentário. Revestimento de Dentadura. Prótese Total

AValiação DA DIFERENÇA NA FISIONOMIA DE PACIENTES REABILITADOS COM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL: ESTUDO PILOTO.

Francine Daiane Lauermann*, Adriana Corsetti.

Introdução: Prótese Bucomaxilofacial tem por objetivos restaurar a estética, função, proteção dos tecidos e auxiliar na terapia psicológica de pacientes traumatizados na região da face. Objetivos: estimar a proporção de pacientes esteticamente satisfeitos após reabilitação com prótese nasal, óculo palpebral e ocular, comparar a diferença entre a auto percepção do paciente e a média da percepção dos avaliadores e verificar viabilidade da metodologia e cálculo de amostra da pesquisa definitiva. Metodologia: foram selecionados 8 pacientes que avaliaram sua fisionomia antes e após a reabilitação através de fotografias e uma escala empírica de 7 graus. Após, 10 graduandos avaliaram as imagens dos pacientes com o mesmo instrumento. A melhora estética foi verificada pela diferença entre antes e após a reabilitação, sendo o *score* final igual a 0 não obteve melhora, de 1 a 3 obteve melhora razoável e 4 a 6, melhora muito importante. Resultados: nas auto avaliações, três pacientes obtiveram melhora razoável e cinco, muito importante. Pelos avaliadores, um paciente não obteve melhora, quatro obtiveram melhora razoável e três, muito importante. Pelo teste de Wilcoxon pareado, foi demonstrado que pacientes e estudantes não possuem a mesma opinião e a percepção dos pacientes obteve scores maiores. O teste Kappa indicou que a concordância entre os avaliadores não foi totalmente aleatória. Conclusões: 7/8 dos pacientes obtiveram satisfação e melhora estética considerável. Em nenhum caso houve prejuízo na estética. Pela