



Evento	Salão UFRGS 2020: SIC - XXXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2020
Local	Virtual
Título	ESCALA DE BRADEN E ESCALA INTEGRARE: EVIDÊNCIAS CLÍNICAS DE PACIENTES EM RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO
Autor	FRANCIELE MOREIRA BARBOSA
Orientador	AMÁLIA DE FATIMA LUCENA

FRANCIELE MOREIRA BARBOSA
ORIENTADORA PROF DRA AMALIA DE FATIMA LUCENA

**ESCALA DE BRADEN E ESCALA INTEGRARE: EVIDÊNCIAS CLÍNICAS DE
PACIENTES EM RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO**

JUSTIFICATIVA: Na prevenção de lesão por pressão (LP) é fundamental que o enfermeiro avalie os fatores de risco dos paciente vulneráveis. O uso de escalas preditoras de risco, como Escala de Braden e Escala Integrare, em fase de validação no Brasil, são instrumentos facilitadores. Porém, são necessários estudos sobre a Integrare, construída com base na Nursing Outcomes Classification/NOC. **OBJETIVO:** Comparar os escores da Escala Braden com os indicadores da NOC, que compõem a Escala Integrare, em pacientes com LP. **MÉTODO:** Estudo transversal em hospital universitário. Amostra de 57 pacientes hospitalizados nas unidades clínicas, cirúrgicas e de terapia intensiva. Coleta de dados em prontuário e à beira leito. Análise estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética (2018-0390). **RESULTADOS:** Dentre os 57 pacientes, um apresentou risco muito alto para LP (escore Braden ≤ 9) e escores entre 1 e 2 (NOC/Integrare) nos indicadores de sensibilidade somente a estímulo, palidez na pele/mucosas, incontinência urinária, com IMC $18,5 < 24,9 \text{ kg/m}^2$ e limitação para posicionar-se no leito; 19 (33%) apresentaram risco alto para LP (escore Braden $10 < 12$) e escores entre 1 e 3 (NOC/Integrare), sensibilidade na metade do corpo, palidez na pele/mucosas, incontinência urinária, obesidade e limitação para posicionar-se no leito; 16 (28%) apresentaram risco moderado para LP (escore Braden $13 < 14$), escores entre 2 a 4 (NOC/Integrare), sensibilidade somente em uma das extremidades, palidez na pele/mucosas, incontinência urinária, obesidade e posicionamento no leito com auxílio; 15 (26%) apresentaram baixo risco para LP (escore Braden $15 < 18$), escores entre 3 a 4 (NOC/Integrare), sensibilidade nas duas extremidades, palidez na pele/mucosas, incontinência urinária, obesidade e posicionamento sem auxílio; 6 (11%) pacientes não apresentaram risco para LP. **CONCLUSÃO:** Observou-se similaridade entre os escores da Escala de Braden e dos indicadores da NOC/Escala Integrare.