

crítico com COVID-19. Método: Estudo de caso realizado no Centro de Terapia Intensiva de um hospital público universitário de maio a junho de 2021. O paciente recebeu tratamento convencional com curativos tópicos e TLBP como adjuvante. Foi utilizada uma dose de energia de 0,5J/cm² com o laser Therapy EC/DMC, com comprimento de onda de 880nm (infravermelho) e 660nm (vermelho). A aplicação ocorreu de forma pontual, com aplicação de 11 pontos nas bordas e no leito da lesão. O processo cicatricial foi avaliado, a partir de cinco indicadores do resultado NOC Cicatrização de feridas: segunda intenção: : necrose, granulação, exsudato/drenagem, espessura e tamanho reduzido da ferida. A análise levou em consideração a escala Likert de 5 pontos, em que 1 corresponde ao pior escore e 5 ao mais desejável. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (Parecer n.º 2.607.821). Resultados: Após 25 dias de acompanhamento evidenciou-se evolução de 92% do processo cicatricial, comparando os escores de resultado do 1º ao 25º dia. Houve controle de fatores intrínsecos (controle de mediadores inflamatórios, hipoxemia, anemia, controle glicêmico, etc) e extrínsecos (ventilação mecânica, drogas vasoativas, terapia renal substitutiva, internação prolongada), que envolvem um trabalho multidisciplinar. Conclusão: A avaliação do processo cicatricial pelos resultados de enfermagem qualifica o trabalho da enfermagem no cuidado com feridas e a assertividade na escolha do tratamento. A TLBP mostrou-se efeito positivo para a regeneração tecidual da úlcera venosa.

1943

DEFICIT DE MEMÓRIA EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO SUBMETIDOS À ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)

CATEGORIA DO TRABALHO: PRÁTICAS INSTITUCIONAIS INOVADORAS

Vanessa Menegalli, Francine Moraes da Silva, Aline Oliveira

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Introdução: O transtorno depressivo maior está presente em grande parte da população mundial, acarretando prejuízos laborais e sociais ao indivíduo. Tem como característica principal alterações nas emoções, predominando sintomas como: tristeza, melancolia, anedonia, choro fácil e baixa autoestima. Uma alternativa de tratamento ao referido transtorno é a eletroconvulsoterapia (ECT) que caracteriza-se como um procedimento de estimulação cerebral de alta eficácia. A técnica de ECT foi aperfeiçoada ao longo dos anos, como o uso de relaxantes musculares e anestésicos, bem como padronização da carga elétrica gerada. Uma contraindicação do procedimento é o déficit de memória. Este sintoma, que pode ocorrer algumas vezes, é caracterizado como uma confusão pós-ictal, amnésia e desorientação. O diagnóstico de enfermagem (DE) Memória Prejudicada relacionada a Distúrbios Neurológicos é definido como: incapacidade de recordar informações ou habilidades comportamentais, de reter novas informações e recordar eventos. Faz parte do domínio percepção/cognição sendo a classe cognição. Objetivo: Descrever os Cuidados de Enfermagem (CE) realizados aos pacientes com DE Memória Prejudicada na Unidade de Internação Psiquiátrica (UIP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, tipo relato de experiência, realizado por Enfermeiras que trabalham na UIP, que descreve os CE realizados aos pacientes com DE Memória Prejudicada na UIP do HCPA. Relato de experiência: Os pacientes com DE Memória Prejudicada necessitam de intervenções específicas e de equipe multiprofissional especializada para atender às suas necessidades de saúde. Os cuidados prescritos pelos enfermeiros foram: estimular a memória recente por meio da aplicação de técnicas de memorização; dar oportunidade para uso da memória de eventos remotos por meio de rodas de conversas, músicas. Conclusão: A realização do cuidado de enfermagem de maneira sistematizada permitiu o resultado eficaz ao tratamento do paciente com DE Memória Prejudicada, contribuindo para realizar uma assistência de qualidade e humanizada, além de possibilitar melhor compreensão do Processo de Enfermagem com o uso das taxonomias NANDA I, NOC e NIC para os profissionais envolvidos no caso, bem como, para revisar as reais necessidades de cuidado para pacientes com DE Memória Prejudicada submetidos a ECT.