



## Conectando vidas Construindo conhecimento



### XXXIII SIC SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2021: SIC - XXXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2021
<b>Local</b>	Virtual
<b>Título</b>	VALIDAÇÃO DA SKIN PICKING SCALE-REVISED PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO
<b>Autor</b>	MURILO GANDON BRANDÃO
<b>Orientador</b>	GISELE GUS MANFRO

# VALIDAÇÃO DA SKIN PICKING SCALE-REVISED PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO

**Aluno:** Murilo Gandon Brandão

**Orientadora:** Prof. Dra. Gisele Gus Manfro

**Instituição:** Universidade Federal do Rio Grande do Sul

**Introdução:** O Transtorno de Escoriação (TE) é um transtorno que acomete cerca de 1,4% a 5,4% da população geral, tendo maior prevalência na população psiquiátrica (7% a 30%). Dentre os instrumentos utilizados para avaliar o impacto da doença nos pacientes, destaca-se a Skin-Picking Scale Revised (SPS-R), que ainda não foi validada para o português. O **objetivo** deste estudo é apresentar dados sobre a análise de validação da SPS-R para o português brasileiro. **Metodologia:** A escala foi traduzida e adaptada para o português brasileiro. Após, foi retrotraduzida e enviada para os autores da escala original, que aprovaram a versão. Foi então aplicada no formato on-line em pacientes com diagnóstico psiquiátrico atual de TE. O diagnóstico foi realizado por psiquiatras treinados em atendimento remoto. A validade concorrente da escala foi realizada através do cálculo do coeficiente de correlação ( $r$ ) com as escalas Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQI), escala de ansiedade generalizada (GAD-7) e questionário de saúde do paciente (PHQ-9), as quais avaliam respectivamente a qualidade de vida em doenças dermatológicas, os sintomas ansiosos e os sintomas depressivos. **Resultados:** Foram incluídos 124 pacientes nas análises. A escala demonstrou boa consistência interna, com coeficiente alfa de Cronbach de 0,84. As análises fatoriais exploratória e confirmatória demonstraram distribuição em dois fatores (prejuízo e gravidade) similares à escala original. A validade concorrente demonstrou correlação com as escalas DLQI ( $r=0,73$ ), GAD-7 ( $r=0,51$ ) e PHQ-9 ( $r=0,43$ ). **Discussão:** a versão em português brasileiro da Skin Picking Scale-Revised é um bom instrumento com boas propriedades psicométricas para avaliar o impacto do Transtorno de Escoriação, podendo ser utilizada na avaliação de pacientes brasileiros.