



XXXIII SIC SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Evento	Salão UFRGS 2021: SIC - XXXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2021
Local	Virtual
Título	CARACTERÍSTICAS DOS SUICÍDIOS DE JOVENS EM PORTO ALEGRE DE 2010 A 2016
Autor	JÉSSICA LEANDRA GONÇALVES DA SILVA
Orientador	PEDRO VIEIRA DA SILVA MAGALHÃES

CARACTERÍSTICAS DOS SUICÍDIOS DE JOVENS EM PORTO ALEGRE DE 2010 A 2016

Jéssica Leandra Gonçalves da Silva, orientada por Prof. Dr. Pedro Vieira da Silva Magalhães, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Justificativa: O suicídio de crianças e adolescentes é uma das principais causas de morte nesta faixa etária no ocidente. É um evento trágico com sérios efeitos nas famílias, amigos e comunidades envolvidas. A ocorrência pode ser subestimada em idades mais precoces por inúmeros fatores, dificultando a notificação. O estudo das características dos suicídios de jovens é bastante incipiente, com alguns estudos realizados em torno do mundo, mas nenhum no Brasil. **Objetivos:** Relatar as taxas e descrever características demográficas, aspectos toxicológicos, criminais e forenses de suicídios de jovens entre 10 e 24 anos atendidos pelo Departamento Médico Legal de Porto Alegre (DML) de 2010 a 2016. **Metodologia:** Estudo transversal com dados coletados do DML e da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Examinados 1.321 suicídios. Obtidos dados de análises toxicológicas e ocorrências policiais. As taxas foram calculadas de acordo com sexo e faixa etária (<15 anos, 15-19 anos e 20-24 anos). **Resultados:** Ocorreram 143 suicídios na faixa etária estabelecida, 10% do número total, sendo 84% de homens e 16% de mulheres. A idade média das vítimas foi de 20 anos. O enforcamento foi o método mais utilizado, principalmente entre 20 e 24 anos. O uso de armas de fogo foi o mais comum dos 10 aos 14 anos. Em relação aos antecedentes criminais, 50% das vítimas do sexo masculino e 30% do feminino tinham histórico de alguma ocorrência. Além disso, 44% da amostra apresentou toxicologia positiva para pelo menos uma substância, sendo o álcool a mais prevalente. **Conclusões:** O enforcamento foi o método mais comum de suicídio, mas houveram variações por sexo e idade. Foi encontrada frequência maior de suicídio por arma de fogo em menores de 15 anos. Os dados precisos sobre os métodos de suicídio são importantes para o planejamento de estratégias e programas de prevenção.