



**REENCONTROS
NOVOS ESPAÇOS
OPORTUNIDADES**

XXXIV SIC Salão Iniciação Científica

26 - 30
SETEMBRO
CAMPUS CENTRO

Evento	Salão UFRGS 2022: SIC - XXXIV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2022
Local	Campus Centro - UFRGS
Título	A autopercepção da disartria em pacientes com Doença de Parkinson condiz com o diagnóstico fonoaudiológico?
Autor	FERNANDA VENZKE ZARDIN
Orientador	MAIRA ROZENFELD OLCHIK

JUSTIFICATIVA: A Doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neurológicas mais prevalentes. Muitos pacientes apresentam alterações de fala, sendo assim buscamos verificar a utilidade de um protocolo de rastreamento para esta população.

OBJETIVOS: Comparar o grau de disartria com a autopercepção de fala avaliada pelo paciente.

METODOLOGIA: Estudo transversal aprovado pelo CEP/HCPA sob o número 2021-0386. Foram incluídos pacientes com DP do ambulatório de Distúrbios do Movimento de um hospital de referência do sul do Brasil. Excluíram-se sujeitos que apresentavam outras condições neurológicas ou sistêmicas. Os participantes responderam ao protocolo ROMP- fala, que avalia a autopercepção da fala. A fala foi coletada com o microfone acoplado a um gravador com distância de 2 cm da boca. As tarefas de fala incluíram a produção da vogal /a/ sustentada, /iu/ alternadamente, diadococinesia /pa-ta-ka/ e fala espontânea. A análise perceptivo-auditiva foi realizada por 3 fonoaudiólogas treinadas que classificaram a disartria em normal, leve, moderada ou grave. Dados clínicos dos pacientes foram retirados de prontuários.

RESULTADOS: Dezoito indivíduos com DP participaram do estudo, sendo 13 (72,2%) homens e 5 (27,8%) mulheres. A idade média total dos participantes foi de 58,38 ($\pm 7,22$) anos e a duração média da doença foi de 19,38 ($\pm 6,64$) anos. No total, 4 (22,2%) dos pacientes fazem uso de DBS com tempo médio de 3,5 ($\pm 2,8$) anos. Os achados da pesquisa indicaram que treze (72,2%) pacientes apresentaram disartria leve e a pontuação média total do ROMP foi de 16,38 ($\pm 4,7$). Três (16,6%) apresentaram disartria moderada e pontuação média do ROMP de 12,33 ($\pm 5,03$). E dois (11,1%) apresentaram fala normal e pontuação média do ROMP de 7,5 ($\pm 0,71$).