

SESSÃO DE POSTERES

Perda auditiva e zumbido na otite média crônica

Autor(es): Márcia Salgado Machado; Adriane Ribeiro Teixeira; Leticia Petersen Schmidt Rosito; Sady Selaimen da Costa

Introdução: O zumbido é um sintoma cada vez mais prevalente na população mundial. No entanto, poucos estudos avaliaram sua prevalência, especialmente em indivíduos com alterações de origem condutiva. **Objetivo:** analisar a prevalência e a intensidade do zumbido em relação ao tipo e grau da perda auditiva em indivíduos com otite média crônica. **Métodos:** Foram analisados os prontuários médicos de 1342 sujeitos provenientes de um ambulatório de atendimento a pacientes com otite média crônica, totalizando 2684 orelhas analisadas. As variáveis estudadas foram: presença e intensidade do zumbido, tipo e grau de perda auditiva dos sujeitos da amostra. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital vinculado ao projeto (número do protocolo 14918). **Resultados:** a prevalência de zumbido foi de 37,2% e a maior proporção foi a intensidade leve (39,7%) nas orelhas dos sujeitos estudados. O zumbido foi mais prevalente nas perdas mistas (209%), seguido das perdas condutivas (aumento de 160%), quando comparadas com as orelhas normais. Também foi possível constatar que a prevalência de zumbido aumenta do grau leve até o severo de perda auditiva (aumentando de 135% para 201%), quando comparados a orelhas sem perda auditiva. Houve associação significativa entre a intensidade do zumbido e o tipo e o grau da perda auditiva na orelha correspondente ($p < 0,001$). Orelhas sem perda auditiva apresentaram maior proporção de zumbido leve ao passo que as orelhas com perda auditiva mista apresentaram maior proporção de zumbido intenso. Quanto ao grau da perda auditiva, as orelhas com grau moderado e severo apresentaram maior proporção de zumbido intenso. **Conclusão:** Quanto à presença do zumbido, identificou-se maior prevalência em perdas auditivas mistas, bem como em perdas auditivas de grau leve a severo. Em relação à intensidade do zumbido, identificou-se maior proporção de zumbido intenso em perdas auditivas mistas e em perdas auditivas de grau moderado e severo. Portanto, a otite média crônica gera elevada prevalência de zumbido, de forma mais intensa nos sujeitos com perda auditiva do tipo mista, bem como nas perdas auditivas de grau moderado a severo.

Dados de publicação

Página(s) : p.3633

ISSN : 1983-179X

http://www.audiologiabrasil.org.br/eia/anais/trabalhos_select.php?id_artigo=3633&tt=SESSÃO

DE
POSTERES

DE