





## REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Volume 43, Supl. - setembro 2023









## **FONOAUDIOLOGIA**

## 2048 - MIGRÂNEA VESTIBULAR E SUAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM ADOLESCENTES

Camila Franciozi, Viviann Magalhães Silva Borges, Rebeca Cardona Santa Helena, Luísa Frölich Krüger, Pricila Sleifer

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

INTRODUÇÃO: A migrânea é um tipo de cefaleia primária incapacitante que, quando associada a crises de vertigem, configura-se migrânea vestibular. Estima-se que a sua prevalência mundial seja de um a cada 10 indivíduos, sendo apontada como a causa mais comum de vertigem em adolescentes, interferindo no desempenho motor e na interação social. O diagnóstico requer investigação cautelosa, pois os sintomas podem estar associados a diferentes condições clínicas. OBJETIVOS: Verificar as principais manifestações clínicas da migrânea em adolescentes. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo a questão norteadora: Quais as principais manifestações clínicas da migrânea vestibular em adolescentes com queixa de tontura ou vertigem?. As buscas foram executadas nas bases de dados eletrônicas PubMed/Medline, Cochrane Central, SciELO e BVS, em junho de 2022. Para seleção e avaliação foram estabelecidos como critérios de inclusão: publicações entre 2012 e junho de 2022, estudos e ensaios clínicos envolvendo seres humanos, objetivando avaliar indivíduos entre 12 e 18 anos diagnosticados com migrânea. Foram excluídos os seguintes estudos: aqueles em que o grupo com migrânea apresentava outra patologia associada que pudesse interferir nas manifestações, sobre efeitos de medicações, revisões sistemáticas da literatura, com animais, cartas ao editor, capítulos de livro, anais científicos, relatos de caso e que não forneceram informações suficientes. Após, dois revisores realizaram a triagem e foi efetuada a leitura na íntegra dos selecionados. RESULTADOS: Os estudos referem como principais sintomas a dor na região de ombros e cervical, tontura, vertigem, náusea, vômitos, fotofobia, fonofobia e a osmofobia. Tais manifestações clínicas são comuns a outros quadros e, consequentemente, levam a outras hipóteses diagnósticas que podem prejudicar a adequada identificação da migrânea. De modo geral, todos os adolescentes com migrânea vestibular tiveram algum sintoma ou diagnóstico psicológico, a ansiedade e a depressão foram os mais citados. CONCLUSÕES: Verificou-se que as principais manifestações clínicas da migrânea na adolescência foram dor na região de ombros e cervical, tontura, vertigem, náusea, vômitos, fotofobia, fonofobia e a osmofobia. A identificação precoce é essencial para direcionar a prática clínica de profissionais de saúde que prestam assistência ao público adolescente e podem encaminhar para diagnóstico precoce e tratamento devido.