



XXXV SALÃO de INICIAÇÃO CIENTÍFICA

6 a 10 de novembro

Evento	Salão UFRGS 2023: SIC - XXXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2023
Local	Campus Centro - UFRGS
Título	Reprodutibilidade intra-avaliador e interavaliador do Checklist Postural do protocolo de Avaliação Remota da Postura Estática (ARPE)
Autor	MARINA ZIEGLER FRANTZ
Orientador	CLAUDIA TARRAGO CANDOTTI

Justificativa: Com a imposição do isolamento social em decorrência da pandemia, surgiu a necessidade de realizar avaliação postural por meio do atendimento remoto. A avaliação das propriedades de medida é fundamental para que sejam utilizados novos instrumentos de avaliação, sejam por um único avaliador em períodos de tempo diferentes ou por avaliadores diferentes. Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade intra-avaliador e interavaliador do Checklist Postural do protocolo de Avaliação Remota da Postura Estática (ARPE). Metodologia: A amostra foi composta por 51 participantes e a avaliação postural foi realizada por dois pesquisadores. Para testar a reprodutibilidade intra-avaliador, o protocolo ARPE foi realizado com intervalo de 7 a 10 dias, enquanto a reprodutibilidade interavaliador foi testada por um outro avaliador independente. Foi utilizada estatística Kappa (k) e percentual de concordância (%C), com nível de significância de 0,05. Resultados: Na análise da reprodutibilidade intra-avaliador os valores de k variaram de 0,921 a 1,0, com %C entre 94% e 100% para todos os itens do Checklist Postural do protocolo ARPE. Na reprodutibilidade interavaliador, os valores de k foram superiores a 0,4 para todo Checklist Postural, exceto para quatro itens: cinturas na foto de frente ($k=0,353$), escápulas na foto de costas ($k=0,310$), linhas poplíteas dos joelhos na foto de costas ($k=0,270$) e postura dos pés na foto de costas ($k=0,271$). No entanto, os %C foram superiores a 50%, com exceção do item escápulas (%C=47%). Observa-se, então, que o checklist do protocolo ARPE é reprodutível, porém quando utilizados por diferentes avaliadores os itens cinturas (plano frontal de frente), escápulas, joelhos linha poplíteia e pés (plano frontal de costas) não devem ser considerados.