



XXXV SALÃO de INICIAÇÃO CIENTÍFICA

6 a 10 de novembro

Evento	Salão UFRGS 2023: SIC - XXXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2023
Local	Campus Centro - UFRGS
Título	Impacto na saúde psíquica dos trabalhadores de enfermagem do serviço de emergência durante e após a pandemia de Covid-19
Autor	LAURA BETINA LUCCA DA SILVA
Orientador	JULIANA PETRI TAVARES

Introdução: Durante a pandemia, os serviços de emergência atenderam, majoritariamente, pacientes com casos graves de Covid-19, enfrentando mudanças na rotina de trabalho, gerando impactos físicos e emocionais nos profissionais¹. Com a diminuição de casos, os serviços de emergência passaram a atender uma demanda represada de pacientes crônicos agudizados, afetando a carga de trabalho. Esses fatores, podem tornar os profissionais vulneráveis ao desenvolvimento de Distúrbios Psíquicos Menores (DPM)². **Objetivo:** Identificar prevalência de DPM em trabalhadores de enfermagem da área de emergência hospitalar, durante e após a pandemia da Covid-19. **Métodos:** Estudo transversal realizado nos períodos de 2020 e 2022 incluindo quatro serviços de emergência hospitalar referência para atendimento de doentes com coronavírus. Dados coletados via *Google Forms*, constituído por questões sociodemográficas e pelo Self-Reporting Questionnaire³, para rastrear DPM. Realizadas análises descritivas e de prevalência. Projeto aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, parecer nº 4.152.027. **Resultados:** Amostra composta por 119 profissionais de enfermagem. Em 2020, 57 participaram, sendo 42,1% enfermeiros, 56,1% Técnico de Enfermagem e 1,8% Auxiliar de Enfermagem. O maior percentual do sexo feminino (70,2%), apresentavam suspeita de DPM (54,4%), e estavam afastados por motivos de saúde (33,3%). Em 2022, obtiveram-se 62 participantes. Destes 77,4% eram do sexo feminino. Em relação aos cargos, 51,6% enfermeiros, 46,8% Técnico Enfermagem, 1,6% Auxiliar Enfermagem. A prevalência de DPM nestes profissionais foi de 51,6% e 50% foram afastados por motivos de saúde. **Conclusões:** Identificou-se elevadas prevalências de DPM em trabalhadores de enfermagem da área de emergência hospitalar, durante e após a pandemia da Covid-19, requerendo estratégias de promoção de saúde mental destes profissionais.