

## Poster

### 23 RESULTADOS ALCANÇADOS POR PACIENTES INTERNADOS COM DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ EM UNIDADES CLÍNICAS

Autores:

Mariana Palma da Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) ; Marcos Barragan da Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) ; [Bruna Engelmann \(brunaengelmann@gmail.com\)](mailto:brunaengelmann@gmail.com) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) ; Manoela Schmarczek Figueiredo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) ; Miriam de Abreu Almeida (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL)

Resumo:

INTRODUÇÃO: PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) E BRONCOPNEUMONIA (BCP), USUALMENTE APRESENTAM DISPNEIA E TOSSE. MUITOS NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E REQUEREM HOSPITALIZAÇÕES RECORRENTES. NA AVALIAÇÃO CLÍNICA DESTES PACIENTES, O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM (DE) PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ (PRI) TEM SIDO PREVALENTE NO HOSPITAL EM ESTUDO. BUSCA-SE ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DESTES PACIENTES UTILIZANDO-SE A NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION (NOC) PARA MENSURAR OS RESULTADOS SENSÍVEIS ÀS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM. OBJETIVO: AVALIAR OS RESULTADOS DE ENFERMAGEM NOC ALCANÇADOS POR PACIENTES COM O DE PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ INTERNADOS EM UNIDADES CLÍNICAS. MÉTODO: ESTUDO LONGITUDINAL COM PACIENTES PORTADORES DE DPOC OU BCP EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IDADE = 18 ANOS, AMBOS OS SEXOS E QUE CONCORDARAM EM PARTICIPAR DO ESTUDO. A AVALIAÇÃO DO PRI OCORREU EM QUATRO DIAS CONSECUTIVOS, DE OUTUBRO A JANEIRO DE 2016. APLICOU-SE UM INSTRUMENTO CONSTRUÍDO PELOS PESQUISADORES CONTENDO TRÊS RESULTADOS DE ENFERMAGEM ( INDICADORES): ESTADO RESPIRATÓRIO (FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SONS RESPIRATÓRIOS ADVENTÍCIOS, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, CIANOSE, DISPNEIA, FEBRE E TOSSE); NÍVEL DE FADIGA (DOR MUSCULAR);NÍVEL DE ANSIEDADE (QUALIDADE DO REPOUSO E ANSIEDADE VERBALIZADA). ELES FORAM AVALIADOS POR MEIO DE ESCALAS LIKERT, QUE VARIARAM DE GRAVE (1) A NENHUM (5). UTILIZOU-SE ESTATÍSTICA DESCRITIVA PARA ANÁLISE DOS DADOS. O PROJETO FOI APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM SAÚDE DO HOSPITAL (11-0601). RESULTADOS: AVALIARAM-SE 23 PACIENTES COM PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ, PREDOMINANTEMENTE DO SEXO FEMININO 15 (65,2%), BRANCOS 19 (82,6%), IDADE MÉDIA DE 64 ( $\pm 7,40$ ). QUANTO AO MOTIVO DA INTERNAÇÃO, 16 PACIENTES (69,6%) INTERNOU POR SINTOMAS NÃO DIRETAMENTE LIGADOS À BRONCOPNEUMONIA OU DPOC. TODAVIA, 19(82,6%) POSSUÍAM DOENÇA PULMONAR PRÉVIA. OBSERVOU-SE MELHORA NA MÉDIA EM TODOS OS RESULTADOS DE ENFERMAGEM. CONCLUSÃO: A NOC POSSIBILITOU AVALIAR O PADRÃO RESPIRATÓRIO DOS PACIENTES COM DPOC E BCP, AO EVIDENCIAR MELHORA A SOBRETUDO, NOS INDICADORES FEBRE, TOSSE E ANSIEDADE VERBALIZADA CONTRIBUIÇÕES OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM. NOVAS PESQUISAS SÃO NECESSÁRIAS ACERCA DESTA CLASSIFICAÇÃO A FIM DE SELECIONAR INDICADORES QUE DEMONSTREM A EFICÁCIA DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM. PALAVRAS CHAVE: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS, AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.