

RELATO DE CASO - CARCINÓIDE TÍMICO

JULIO DE OLIVEIRA ESPINEL; LORENZI W., ALMEIDA V. A., C. F. ANDRADE, SAUERESSIG M. G., MORESCHI A. H.

Introdução: Carcinóide tímico é um tumor raro, havendo cerca de 300 casos registrados na literatura médica. É uma das causas de produção ectópica de ACTH. Objetivo: Discutir um caso de massa mediastinal em paciente com síndrome de Cushing. Relato do caso: Paciente feminina, jovem investigando síndrome de Cushing. Submetida a exploração de sela túrcica por exame de imagem alterado – não foi encontrada lesão hipofisária. Na sequência do caso, submetida a adrenalectomia bilateral. Perdeu acompanhamento com a equipe assistente. Reaparece no ambulatório novamente com síndrome de Cushing - na investigação exame de imagem de tórax alterado. Massa mediastinal volumosa, com crescimento lento em 1 ano de observação. Encaminhada ao serviço de cirurgia torácica. Realizada mediastinotomia para diagnóstico histológico – laudo anatomopatológico sugestivo de paraganglioma. Arteriografia para tentativa de embolização – não identificado claramente vasos nutrientes passíveis de embolização. Optado por tratamento cirúrgico. No transoperatório, identificada massa em topografia de timo – ressecada em bloco. Laudo anatomopatológico e imunoistoquímica da peça: carcinóide tímico. No PO houve melhora sintomática e laboratorial da paciente. Conclusão: O papel das diferentes modalidades terapêuticas do carcinóide tímico é controverso na literatura devido a pequena experiência dos diferentes grupos.