

RESULTADOS DE ENFERMAGEM NOC VALIDADOS PARA DIAGNÓSTICOS NA ÁREA MATERNO-INFANTIL

**Ana Paula de Oliveira Siqueira¹, Bruna Paulsen Panato², Caroline Kullmann Ribeiro³,
Marcos Barragan da Silva⁴, Miriam de Abreu Almeida⁵**

ana.o.siq@gmail.com



INTRODUÇÃO

A *Nursing Outcomes Classification* (NOC) é a classificação mais desenvolvida e utilizada para avaliação de resultados dos cuidados de enfermagem, sendo complementar a outras duas classificações: a *North American Nursing Diagnosis Association* – NANDA, que agrupa os Diagnósticos de Enfermagem (DE) e a *Nursing Intervention Classification* – NIC, que agrupa as intervenções e atividades de enfermagem. O hospital campo desse estudo trabalha o Processo de Enfermagem (PE) de maneira informatizada nas fases de diagnóstico, baseado na NANDA-I e no referencial da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, e prescrição, com base na NIC. No entanto, os Resultados de Enfermagem (RE) não são mensurados utilizando-se linguagem padronizada. Em etapa anterior, verificou-se que os três DE mais utilizados na área materno-infantil do referido hospital foram: Conforto Alterado, Risco de Volume de Líquidos Deficiente e Risco de Amamentação Ineficaz.

OBJETIVO

Validar o conteúdo dos RE NOC mais utilizados para os DE *Risco de Amamentação Ineficaz*, *Conforto Alterado* e *Risco de Volume de Líquidos Deficiente*, que foram identificados como os mais frequentes na área materno-infantil do referido hospital, em estudo anterior.

METODOLOGIA

Estudo descritivo transversal do tipo validação de conteúdo, realizado na área materno-infantil de um hospital universitário do sul do Brasil. A amostra foi composta por enfermeiros peritos que atenderam aos critérios de inclusão. Para a coleta de dados, elaborou-se um instrumento contendo sete colunas: o resultado com a sua definição, uma escala Likert de 5 pontos (não importante a extremamente importante) e espaço para observações. A análise dos dados se deu por estatística descritiva, calculando-se a média ponderada das notas atribuídas pelos peritos a cada RE NOC (Fehring, 1987). O projeto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa da universidade e pelo Comitê de Ética do hospital; todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação no estudo.

Resultado de Enfermagem NOC	Não importante	Pouco importante	Moderadamente importante	Importante	Muito importante	Observações
Amamentação: desmame Definição: descontinuação progressiva da amamentação.	1	2	3	4	5	
Amamentação: manutenção Definição: continuação da amamentação de um neonato/lactente.	1	2	3	4	5	
Conhecimento: amamentação Definição: extensão da compreensão transmitida sobre a lactação e nutrição do bebê por meio da amamentação.	1	2	3	4	5	

RESULTADOS

Dos 30 instrumentos distribuídos, 23 foram devolvidos pelos peritos e apenas nove foram incluídos no estudo. Para o DE *Conforto Alterado*, foram validados dois dos 12 RE sugeridos pela NOC. Para *Risco de Amamentação Ineficaz*, dos 22 RE contidos na taxonomia, 15 foram validados pelos peritos. *Risco de Volume de Líquidos Deficiente* teve 10 RE NOC validados, para os 30 sugeridos pela literatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os RE validados possibilitarão atualizar o PE informatizado do hospital, além de avaliar o impacto das intervenções de enfermagem na área materno-infantil. Em continuidade serão validados os indicadores destes RE.

¹ Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem/UFRGS. Bolsista de Iniciação Científica PROBIC/FAPERGS.

² Acadêmicas do Curso de Graduação em Enfermagem/UFRGS. Bolsistas de Iniciação Científica. PIBIC/UFRGS

⁴ Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem/UFRGS

⁴ Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem/EEUFRGS.

⁵ Enfermeira. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem/UFRGS. Doutora em Educação/PUCRS