

133

HISTÓRIA NATURAL DA HYLTA LEPTOLINEATA NO PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA, RS. *Meriële Reinke, Leonardo Francisco Stahnke, Clarice Hofstadler Deiques (orient.) (UNISINOS).*

A *Hyla leptolineata* é um hílideo de distribuição restrita a região sul do Brasil, sendo encontrado principalmente em áreas abertas. Até hoje poucos trabalhos foram realizados sobre esta espécie, desta forma, o objetivo desta pesquisa foi estudar aspectos da história natural da *H. leptolineata*, de modo a contribuir para o conhecimento da anurofauna da região. O presente estudo foi realizado no Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS), localizado numa área total de 102 Km², no município de Cambará do Sul, RS e Praia Grande, SC. A coleta de dados ocorreu no período de dez/2003 a jul/2005, com intervalos mensais, em corpos d'água nos biomas de Estepe, Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa do PNAS, durante 373 horas de atividades de procura visual. Para cada espécime providenciaram-se dados a respeito do hábitat, da morfologia e do comportamento reprodutivo. Registraram-se um total de 439 espécimes coletados, dos quais 71% no bioma Estepe, ocupando corpos de água estagnada, córregos lânticos e remansos. O tamanho médio das fêmeas foi maior que dos machos. A atividade de vocalização ocorreu durante todo o ano, com mais intensidade durante a primavera e verão, decrescendo no outono e sendo interrompida nos meses frios de inverno, em temperaturas inferiores a 6°C. Os meses de janeiro e fevereiro foram os meses com maior ocorrência de indivíduos recém metamorfoseados. O turno de vocalização inicia logo após o crepúsculo e segue até a madrugada. Os sítios de vocalização utilizados são a vegetação: flutuante, emergente, marginal herbácea e arbustiva. As posturas são em ninhos gelatinosos, com 82 a 233 ovos, que dão origem a pequenos girinos negros com tamanho médio total de 5 mm.