

145

COMO É FEITA A SOLICITAÇÃO DO TESTE PARA A DETECÇÃO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) EM GESTANTES SOROPOSITIVAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE?*Paulo Aguiar, Carolina Friedrich, Ariane Backes, Angela Silva, Camila Giugliani, Letícia Feldens, Luciane Santos, Kelli Castilhos, Jane Mattei, Isabel Lovato, Elsa Giugliani, Marcelo Goldani, Humberto**Rosa* (Departamento de Pediatria e Puericultura, Faculdade de Medicina, UFRGS).

A Organização Mundial da Saúde preconiza que todas as gestantes sejam testadas quanto à presença do HIV e que o teste seja voluntário, após aconselhamento. Com o objetivo de avaliar em que condições são solicitados os testes que detectam a presença do HIV em gestantes do município de Porto Alegre, foram entrevistadas todas as puérperas que tiveram os seus filhos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e no Hospital Conceição num período de 2,5 meses (n=1657). Foram identificadas 39 mulheres HIV-positivas (2,3%), sendo 19 diagnosticadas durante a gestação. Deste último grupo, apenas 6 (31,6%) foram adequadamente informadas (aconselhadas) sobre o teste antes da sua realização. As demais foram apenas informadas de que o teste seria solicitado (36,8%), não foram informadas (21%) ou se sentiram obrigadas a realizar o teste (10,5%). Esses resultados indicam que os profissionais de saúde, na ânsia de diagnosticar a presença do vírus em gestantes e prevenir a sua transmissão vertical, estão esquecendo alguns princípios básicos preconizados internacionalmente. (Fapergs).