

Introdução: Enquanto o efeito da depressão e do estresse psicológico interno do indivíduo são mais reconhecidos, no curso da doença cardiovascular, o papel dos eventos vitais (estresse psicossocial) ainda permanece pouco explorado. Rafanelli e cols. (2005), em estudo de caso-controle, compararam sujeitos com Doença Arterial Coronariana (DAC) e sujeitos normais, encontrando que as categorias de eventos vitais foram em sua maioria significativamente mais frequentes nos pacientes, do que nos indivíduos saudáveis.

Objetivos: Avaliar os níveis de estresse psicossocial em sujeitos portadores de Infarto Agudo do Miocárdio e compará-los com sujeitos sem comprometimento coronário.

Materiais e Métodos: Estudo de caso-controle com uma amostra de 105 casos e 100 controles. Foram selecionados e entrevistados, entre os indivíduos submetidos a cateterismo cardíaco na unidade de Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia do HCPA, aqueles com história de Infarto recente (até um mês) e aqueles com as coronárias normais. Para a avaliação dos aspectos clínicos, foram coletadas informações sobre dados pessoais, incluindo fatores de risco para DAC, dados do exame físico e do cateterismo cardíaco. Para a avaliação do estresse psicossocial foi aplicada a Escala Avaliação de Reajustamento Social.

Resultados e Conclusões: O trabalho encontra-se em fase de análise dos dados e ainda não podemos apresentar os resultados. Estes estarão disponíveis na época da apresentação do pôster.