

363

FATORES DE RISCO E TERAPIA FARMACOLÓGICA EM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA ESTÁVEL: UMA COMPARAÇÃO COM O REGISTRO REACH. *Daniele**Lima Alberton, Steffan F Stella, Anderson D Silveira, Gabriel Zago, Henry R Ritta, Rodrigo A Ribeiro, Majoriê Segatto, Ricardo Stein, Carisi Anne Polanczyk (orient.) (UFRGS).*

Introdução: Pacientes atendidos em hospitais universitários no Brasil são usualmente descritos como selecionados e não representativos da população em geral. O REACH é um estudo internacional que avaliou a prevalência dos fatores de risco (FR) e o tratamento da aterotrombose, servindo por sua magnitude como referência para comparação com outras coortes. **Objetivos:** Determinar a prevalência dos FR e a terapia farmacológica (TF) em uma coorte com doença arterial coronariana (DAC) estável, comparando-os com dados do REACH. **Métodos:** Coorte prospectiva de pacientes ambulatoriais de um hospital universitário, com seguimento entre 1998 e 2006. Foram comparadas a prevalência dos FR e a TF da nossa amostra com dados dos pacientes com DAC pertencentes ao REACH. **Resultados:** Dados referentes aos FR do REACH (n=40.258) em relação a nossa coorte (n=392) foram muito semelhantes (tabagismo, HAS, DM, idade e obesidade). No entanto, sexo masculino (70 vs 61; $p < 0,01$) e dislipidemia (77 vs 68; $p < 0,01$) foram mais prevalentes no REACH. Por outro lado, a maioria dos dados referentes à TF se mostrou diferente (Tabela, $*p < 0,01$). **Conclusão:** Esses dados demonstram a representatividade de nossa coorte em relação à população com DAC em geral, indo de encontro ao paradigma de que pacientes atendidos em nível terciário são mais graves. Os dados referentes à TF mostraram maior concordância com as diretrizes vigentes, evidenciando a boa prática realizada. (PIBIC).