
REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

REVISTA HCPA 2005; 25 (Supl 1) :1-251



^a
Semana Científica
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
12º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

Anais

REVISTA HCPA - Volume 25 (Supl 1) - Setembro 2005
International Standard Serial Numbering (ISSN) 0101-5575
Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n.2
Indexada no LILACS

A Correspondência deve ser encaminhada para: Editor da Revista HCPA - Largo Eduardo Zaccaro Faraco - Rua Ramiro Barcelos, 2350
90035-903 - Porto Alegre, RS - Tel: +55-51-2101.8304 - www.hcpa.ufrgs.br

ECTIMA GANGRENOSO EM NEUTROPENIA FEBRIL: RELATO DE 2 CASOS

GUSTAVO ADOLPHO MOREIRA FAULHABER; TIAGO DALTOÉ; FABIO BENEDETTI RODRIGUES; ALETHEA ZAGO; CAROLINE BRUN; ANGÉLICA MAZOCATTO; ALESSANDRA PAZ; CLAUDIA ASTIGARRAGA; LAURA MARIA FOGLIATTO; FLAVO BENO FERNANDES; LUCIA MARIANO DA ROCHA SILLA

Introdução: Ectima gangrenoso é uma afecção cutânea infecciosa, normalmente relacionado com infecção por *Pseudomonas aeruginosa*. A lesão é caracterizada por borda eritematosa e centro com necrose. Sua ocorrência é incomum, apesar da bactéria ser colonizante da pele. Imunodepressão pode ser fator contribuinte para seu surgimento. Relato: Paciente de 18 anos internado para tratamento de LLA, em quimioterapia, iniciou com quadro de neutropenia febril. 3 dias após iniciou com úlceras com centro necrótico e borda eritematosa na região interescapular e couro cabeludo. Biópsia da lesão evidenciou crescimento de *Pseudomonas aeruginosa*. Anátomo-patológico com. Fez tratamento com piperacilina/tazobactam, com melhora da febre e das lesões cutâneas. Após 1 semana, paciente de 17 anos, internado para tratamento de LMA no mesmo quarto, iniciou quadro de neutropenia febril e surgimento de lesões semelhantes na face anterior da tíbia. Biópsia evidenciou crescimento da mesma bactéria. Apresentou boa resposta ao tratamento antibiótico. Discussão: A descrição de 2 casos consecutivos de Ectima gangrenoso por *Pseudomonas* em pacientes neutropênicos no mesmo quarto sugere a transmissão por contato. As cepas apresentavam perfil de sensibilidade a antimicrobianos, apontando também para essa hipótese. Ambos os pacientes apresentavam neutropenia severa na ocasião do episódio, o que provavelmente contribuiu para o desenvolvimento dessa piodermite. Conclusão: O caso nos mostra a importância de isolamento dos pacientes neutropênicos, especialmente de pacientes com infecções ativas e com alta infecciosidade