

304

**NOTA PRÉVIA SOBRE A TRIBO CYSTODERMATEAE NO RIO GRANDE DO SUL.** *Sabrina R. Machado, Clarissa K. Pereira, Greice Anmeter, Antônio B. Pereira* (PPGECIM, Laboratório de Micologia, ULBRA).

A tribo Cystodermateae pertence à família Agaricaceae, ordem Agaricales. Diferencia-se das demais desta família principalmente por possuir lamelas adnatas. Possui hábito lepiotóide, colibióide ou quase tricolomóide, píleo escamoso, esquamuloso, com escamas flocosas ou pulverulento, estipe central, raramente levemente excêntrico, basidiosporos lisos ou equinados. Este trabalho tem como objetivo aferir a ocorrência dos gêneros desta tribo representados na micobiota do Rio Grande do Sul. Através da revisão bibliográfica e do estudo de excicatas de Herbários do Rio Grande do Sul e do material coletado pelos autores, utilizando técnicas usuais de laboratório para estudos de fungos Agaricales para a observação e avaliação de caracteres morfológicos macroscópicos, microscópicos e microquímicos dos basidiomas, foi possível constatar que a tribo Cystodermateae está representada na micobiota da região em estudo pelos gêneros *Cystoderma* e *Ripartitella*, para os quais são representados chaves, descrições e ilustrações que possibilitam a sua clara identificação. (PROICT-ULBRA).