

145

ESTUDO COMPARATIVO DA IMAGEM CORPORAL EM MULHERES MASTECTOMIZADAS COM E SEM RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. Bianca Santos Cechella, Lígia Braun Schermann (Universidade Luterana do Brasil).

O objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar a imagem corporal (IC) em mulheres mastectomizadas com e sem reconstrução mamária (RM). Participaram desta pesquisa 20 mulheres mastectomizadas (10 sem RM e 10 com RM). As alterações na IC foram avaliadas nos dois grupos a partir da aplicação de uma escala Lickert de 4 pontos (BIS - *body image scale*), desenvolvida e validada por Hopwood *et al.* (2001) para uso em pacientes com câncer. Os escores da BIS variam de 0 (zero) a 30 (zero representa ausência de alterações e os escores mais altos representam graus progressivamente mais altos de alterações da IC). A média dos escores da BIS obtidos no grupo A (mastectomizadas sem RM) foi 6,80 e no grupo B (mastectomizadas com RM) foi 9,20, sem diferença estatisticamente significativa (teste *U* Mann-Whitney=36,0; $p=0,287$). A comparação dos escores da BIS, de acordo com a idade, mostrou que a média dos escores do grupo de pacientes com idade <47 anos foi significativamente maior do que a do grupo com idade igual ou >47 anos (teste *U* Mann-Whitney=17,5; $p=0,013$). A comparação dos escores da BIS, de acordo com o tempo de cirurgia, mostrou que a média no grupo de pacientes com tempo de cirurgia ≥ 18 meses foi maior do que a do grupo com <18 meses, mas sem significância estatística (teste *U* Mann-Whitney=29,5; $p=0,119$). Os resultados obtidos mostram que, na presente amostra, não há diferença significativa em relação a aspectos da IC entre mulheres mastectomizadas sem e com RM. Por outro lado, os resultados mostram escores significativamente maiores em mulheres mais jovens (<47 anos). Houve também uma leve tendência a escores maiores quando o tempo de cirurgia era menor do que 18 meses, mas sem significância estatística.