

ETIOLOGIA DAS ESTENOSES URETRAIS NO HCPA

Vinicius Rubin, Eduardo Terra Lucas, Tiago Bortolini, Brasil Silva Neto, Milton Berger, Tiago Elias Rosito

Introdução: Estenoses uretrais são causa comum de consulta com urologista, frequentemente causando sintomas urinários obstrutivos ou infecciosos. No passado as principais causas de estenose uretral eram as inflamatórias, principalmente relacionadas a uretrites gonocócicas. Atualmente, com o advento do tratamento antimicrobiano, o número de casos ligados a infecção vem diminuindo, surgindo outras causas cada vez mais prevalentes de estreitamento uretral, como a iatrogênica, causada pela cateterização ou instrumentação endoscópica do trato urinário, e o trauma. Apesar das diversas causas etiológicas reconhecidas de estreitamento, muitas ainda são desconhecidas, podendo estar relacionadas a traumas perineais não reconhecidos na infância. Objetivo: Definir a etiologia das estenoses uretrais dos pacientes submetidos à uretroplastias no HCPA. Materiais e métodos: Revisão de prontuário das uretroplastias no HCPA entre 2006 e 2011. Resultados e conclusão: Analisamos 162 casos aonde encontramos etiologia iatrogênica em 53(32%), traumática em 34(21%), infecciosa em 23(14%), congênita em 17(11%) e desconhecida em 35(22%). Ao realizarmos análise estratificada por idade (menores de 40 anos, entre 40 e 60 anos e maiores de 60 anos de idade), obtivemos no primeiro grupo, congênita em 15(40%), traumática em 10(27%), iatrogênica em 2(6%) e desconhecida em 10(27%). No segundo, iatrogênica em 20(28%), traumática em 18(26%), infecciosa em 15(22%) e desconhecida em 17(24%). No terceiro grupo, iatrogênica em 38(58%), traumática em 7(11%), infecciosa em 7(11%) e desconhecida em 13(20%). Concluimos que as causas relacionadas à iatrogenia, seja por instrumentação ou cateterização da via urinária, predominam no HCPA, especialmente nos pacientes acima de 60 anos aonde chegam a 58% dos casos.