

# O PAPEL MODERADOR DAS DIMENSÕES DE ANSIEDADE NA CORRELAÇÃO ENTRE O AUTORRELATO E O RELATO PARENTAL DOS SINTOMAS DE ANSIEDADE NA INFÂNCIA

Ana Maria Frota Lisbôa Pereira de Souza<sup>1</sup> & Gisele Manfro<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Contato : [anamariaflps@gmail.com](mailto:anamariaflps@gmail.com)

## INTRODUÇÃO

- Embora ambos sejam essenciais para uma avaliação clínica abrangente, **dados de autorrelato e de relato parental** são muitas vezes **discordantes**.
- Os padrões de concordância/discordância entre informantes são reconhecidamente distintos quanto ao relato de sintomas **internalizantes versus externalizantes** na infância. No entanto, ainda não se sabe com clareza como **diferentes dimensões de ansiedade** são afetadas por esses padrões.
- OBJETIVO DESSE ESTUDO:** investigar se o efeito de concordância/discordância entre informantes era diferente no que depende da **dimensão de sintomas de ansiedade** (e.g., ansiedade generalizada; fobia social; pânico).




Figura 1. Informante pelo efeito da interação da dimensão de ansiedade nas médias da SCAS.

## MÉTODOS

- Participantes:** 420 crianças [idades 8-17 ( $M = 11.90$ ;  $SD = 2.16$ ); 53.7% meninas] e seus respectivos pais [idades 25-74 ( $M = 40.97$ ;  $SD = 8.93$ ); 84.7% mulheres]
- Instrumentos:** Todos os participantes responderam à **Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)** que avalia sintomas de ansiedade das crianças relacionados a: **transtorno de ansiedade generalizada (TAG)**; **transtorno de ansiedade de separação (TASe)**; **fobia social ou transtorno de ansiedade social (TASo)**; e **transtorno de pânico (TP)**.

## CONCLUSÃO

- Pode-se criar uma hipótese de que sintomas de transtorno de ansiedade de separação (TASe) envolvem os responsáveis de forma mais direta, uma vez que exigem comportamentos com maior frequência e atividade dos pais em relação à ansiedade dos seus filhos, quando estes são comparados aos sintomas das outras dimensões de ansiedade avaliadas.
- A discordância entre informantes nas dimensões de ansiedade justifica a importância de se considerar o **papel do informante** na **avaliação pediátrica da ansiedade**.

## RESULTADOS

- Uma **ANOVA** intra-sujeitos, que utilizou como fatores o **informante** (autorrelato e relato parental) e a **dimensão de ansiedade** (TAG, TASe, TASo, e TP) encontrou uma **interação significativa** entre estes dois fatores ( $F(3,364) = 45.97$ ,  $\eta^2 = .275$ ,  $p < .001$ ).
  - TAG, TASo e PD: efeito significativo, com escores **mais altos em autorrelato** em comparação ao relato parental.
- TASe: **não houve efeito de informante significativo nas médias dos escores**.