

Prevalência de comorbidades psiquiátricas em pacientes com Epilepsia do Lobo Temporal

Juliana Bohn Assmann, Maria Paz Hidalgo, Marino Muxfeldt Bianchin (orient.)

Prevalência de comorbidades psiquiátricas em pacientes com Epilepsia do Lobo Temporal
Introdução: Distúrbios psiquiátricos são comuns em pacientes com epilepsia. O objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de co-morbidades psiquiátricas em uma série de pacientes da nossa população com diagnóstico de Epilepsia do Lobo Temporal (ELT), utilizando um formulário de entrevista clínica estruturado e validado para o nosso meio. Métodos: analisamos sintomas neuropsiquiátricos em 43 pacientes com ELT. Os pacientes foram submetidos à avaliação neuropsiquiátrica utilizando o SCID (Structural Clinical Interview for DSM-IV). Em nosso estudo, utilizamos o SCID para dividir os diagnósticos em quatro grupos de distúrbios neuropsiquiátricos: transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos e transtornos relacionados ao uso de álcool e outras substâncias. Resultados: Avaliamos 14 (32,6%) homens e 29 (67,4%) mulheres. Usando o SCID, 24 pacientes (57,1%) tiveram diagnóstico de pelo menos uma co-morbidade psiquiátrica. Os transtornos de humor (depressão maior, por exemplo) foram os mais frequentes, observados em 14 pacientes (33,3%). Em segundo lugar ficaram os transtornos de ansiedade (4 pacientes - 9,3%), seguidos dos transtornos psicóticos (3 pacientes □ 7%) e dos transtornos do uso de substâncias (3 pacientes □ 7%). Discussão: Nós observamos transtornos psiquiátricos em 57,1% dos pacientes (resultados compatíveis com a literatura). Em virtude da alta prevalência desses transtornos, acreditamos que centros para tratamento de epilepsia com atendimento psiquiátrico conjunto poderiam oferecer um tratamento mais completo para os pacientes com epilepsia.